

produits recommandés

double nettoyage



- PreCleanse
- Nettoyant adapté à la condition cutanée

IPL / traitement en profondeur



- Colloidal Masque Base
- Clinical Oatmeal Masque

application cutanée



- Multi-Active Toner
- Redness Relief Essence
- Hydratant adapté à la condition cutanée
- Barrier Defense Booster
- UltraCalming Serum Concentrate
- Invisible Physical Defense SPF 30
- Barrier Repair
- SkinPerfect Primer SPF 30

l'éducation est la fondation de dermalogica

En éduquant nos professionnels de la peau sur les plus récentes technologies et innovations – et en leur fournissant des produits et outils à la fine pointe de la technologie - nous sommes en mesure de leur offrir un avantage concurrentiel.

Notre objectif durable est d'équiper les professionnels de la peau occupés, indépendants et entrepreneurs avec les produits professionnels et le soutien dont ils ont besoin pour continuer à faire croître leur entreprise et à aider les clients à atteindre leur peau la plus saine.



ProSkin
dermalogica

advanced treatments

intense pulsed light

qu'est-ce que la lumière intense pulsée?

La Lumière Intense Pulsée (IPL) utilise spécifiquement les longueurs d'onde de lumière à large spectre visible pour cibler les taches pigmentaires, les rougeurs, les ridules et les rides. Les pulsions intenses de lumière sont attirées par les chromophores, ou couleur, de la peau. Les filtres à l'intérieur de l'appareil sont ensuite appliqués pour cibler spécifiquement les préoccupations cutanées de votre client. Lorsqu'il est appliqué sur la peau, l'appareil créera un flash de lumière; cette lumière est ensuite convertie en chaleur et envoyée aux zones souhaitées tout en préservant les tissus épidermiques. La chaleur est absorbée par sa cible pour ensuite « dissoudre » la préoccupation cutanée. Le corps élimine naturellement les tissus blessés créant une apparence renouvelée ou une quantité minimale de poils.



Traitement en profondeur (10 minutes):

7. Appliquez le **Colloidal Masque Base** ou le **Clinical Oatmeal Masque** si le client est plus réactif. (La peau peut être chaude et un érythème peut être présent immédiatement après l'IPL, par conséquent, seul un masque rafraîchissant et apaisant doit être incorporé à ce traitement.)
8. Remplissez le plan de traitement de votre client pendant que vous attendez, y compris les paramètres de la machine avant de l'éteindre.
9. Retirez le masque avec de l'eau froide et des éponges ou une serviette froide.

Application cutanée (10 minutes):

10. Tonique – avec **Multi-Active Toner** ou **Redness Relief Essence**
11. Sérum (facultatif) - vous pouvez utiliser le **UltraCalming Serum Concentrate** ou le **Barrier Defense Booster**. L'IPL est un excellent traitement pour la peau souffrant de rosacée / télangiectasies, donc les traitements ciblés UltraCalming peuvent être bénéfiques.
12. Hydratant - Utilisez le **Calm Water Gel** ou le **Barrier Repair**. (Évitez les crèmes hydratantes avec des ingrédients tels que la vitamine A, les hydroxy-acides ou d'autres ingrédients exfoliants, puisqu'ils peuvent provoquer une irritation supplémentaire après le traitement).
13. Protéger - Appliquer **Invisible Physical Defense SPF 30** ou **Skin Defense Booster**.

contre-indications:

Coup de soleil ou bronzage récent; exposition au soleil non protégée, lit de bronzage ou solarium utilisé 4 semaines avant le traitement; grossesse; allaitement; cancer; lupus; Hypo-pigmentation (par exemple, vitiligo); historique de convulsions; historique de cicatrices chéloïdes; sévère Dermatite, acné inflammatoire active ou eczéma (dans la zone de traitement); infections actives; Utilisation d'Accutane au cours des 6 derniers mois; médicaments contre le diabète; éclosion de l'herpès simplex (dans la zone de traitement); peau foncée; Vitamine A ou hydroxy acides (acide rétinoïque, trétinoïne / Retin-A, Accutane, hydroxy acides) utilisés dans les 60 jours avant le traitement; Médicaments photosensibilisants; présence d'un stimulateur cardiaque; présence de métal chirurgical, épingles ou plaques sous la peau de la zone de traitement; l'utilisation du millepertuis dans les trois mois avant le traitement; agents anticoagulants (aspirine, ibuprofène ou Aleve utilisés dans la semaine suivant le traitement, anticoagulants); maquillage permanent ou tatouages.

